

Sintesi del foglietto illustrativo di 032163014 - DIMILL*COLLIRIO 10ML 0,01%

DENOMINAZIONE

DI MILL 0,1 MG/ML COLLIRIO, SOLUZIONE

CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA

Antimicrobici.

PRINCIPI ATTIVI

Benzalconio cloruro.

ECCIPIENTI

Sodio cloruro; acqua distillata di Matricaria Chamomilla e Hamamelis V irginiana sterile; acqua depurata.

INDICAZIONI

Per la disinfezione dell'occhio anche irritato da polvere, fumo e smog

.

CONTROINDICAZIONI/EFF.SECONDAR

Ipersensibilita' verso i componenti; non usare in bambini al di sotto dei 12 anni.

POSOLOGIA

Instillare due gocce di prodotto in ciascun occhio, due o tre volte al giorno. Non superare le dosi consigliate.

CONSERVAZIONE

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

AVVERTENZE

Non usare per i trattamenti prolungati; dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili consultare il medico. L'ingestione o l'inalazione accidentale di alcuni disinfettanti puo' avere conseguenze gravi, talvolta fatali. Evitare che la punta del contagocce venga a contatto con gli occhi. Il benzalconio cloruro puo' causare irritazione e agli occhi. Eviti il contatto con lenti a contatto morbide. Tolga le lenti a contatto prima dell'applicazione e aspetti almeno 15 minuti prima di riapplicarle. E' nota l'azione decolorante nei confronti delle lenti a contatto morbide. Non usare mentre si indossano lenti a contatto. In caso di ingestione accidentale del prodotto consultare immediatamente un medico. Non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. Il prodotto e' solo per uso esterno. E' da evitare l'applicazione in caso di infiammazioni, ferite o abrasioni corneali. L'uso, specie prolungato, dei prodotti per uso topico puo' dare origine a fenomeni di sensibilizzazione, in tal caso interrompere il trattamento.

INTERAZIONI

Evitare l'uso contemporaneo di altri antisettici e detergenti.

(Continua...)

Sintesi del foglietto illustrativo di 032163014 - DIMILL*COLLIRIO 10ML 0,01%

EFFETTI INDESIDERATI

E' possibile il verificarsi, in qualche caso, di intolleranza (bruciori e o irritazione), peraltro priva di conseguenze, che non richiede modifica del trattamento.

GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO

Non e' controindicato.