

**Sintesi del foglietto illustrativo di 006228062 - FOILLE SCOTTATURE\*CREMA 29,5G**

## DENOMINAZIONE

FOILLE SCOTTATURE CREMA

## CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA

Dermatologici, anestetici locali.

## PRINCIPI ATTIVI

100 g di crema contengono: alcool benzilico 4 g, benzocaina 5 g, cloro xilenolo 0,1 g.

## ECCIPIENTI

Olio vegetale idrogenato, ceresina (paraffina solida), cera d'api gialla, monodigliceridi (di acidi grassi superiori), olio di mais, calcio idrato, sodio borato, PEG 32, sodio laurilsolfato, anidride maleica, e ugenolo, sodio calcio EDTA, 8-idrossichinolina, acqua depurata.

## INDICAZIONI

Ustioni minori, eritemi solari, irritazioni cutanee da vari agenti chimico-fisici, punture di insetti. Nella medicazione di escoriazioni, abrasioni e ferite superficiali della pelle.

## CONTROINDICAZIONI/EFF.SECONDAR

Ipersensibilit  ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti. Il prodotto non   idoneo per uso oftalmico.

## POSOLOGIA

Applicare la crema, in strato sottile ed uniforme direttamente sulla lesione. In caso di lesioni circoscritte,   opportuno - in seguito all'applicazione della crema - ricoprire con garza sterile. La medicazione non va rimossa per almeno 48 ore, al fine di non turbare il processo di granulazione. In certi casi la medicazione iniziale non dovr  essere rimossa e cambiata anche per maggior periodo di tempo, dovendo per   via via tenerla ben inumidita. Si raccomanda di non superare il limite massimo delle 4 applicazioni al giorno, sia negli adulti che nei bambini.

## CONSERVAZIONE

Conservare a temperatura inferiore a 25 gradi C.

## AVVERTENZE

  per esclusivo uso esterno. L'uso, specie se prolungato, del prodotto puo' dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. L'efficacia e la sicurezza della benzocaina dipendono da un corretto dosaggio. Pertanto   necessario impiegare la quantit  minima di prodotto sufficiente a ottenere l'effetto desiderato, applicandolo con cautela nei soggetti con mucose gravemente danneggiate e sede di processi infiammatori che potrebbero causare un assorbimento eccessivo di tale principio attivo. Deve essere utilizzato solo su lesioni non estese e superficiali della cute e per brevi periodi di tempo. Non applicare in vicinanza degli occhi. In caso di ferite profonde, o di punture di insetti disseminate

(Continua...)

**Sintesi del foglietto illustrativo di 006228062 - FOILLE SCOTTATURE\*CREMA 29,5G**

e, o di ustioni gravi, o ustioni lievi particolarmente estese consulta re sempre il medico prima di utilizzare il prodotto. Se la condizione morbosa per cui questa preparazione viene utilizzata persiste piu' a l ungo, se insorge irritazione, se l'arrossamento, il gonfiore o il dolo re persistono o se si ha un'infezione, sospendere l'uso e consultare i l proprio medico. Non utilizzare il prodotto nei bambini di eta' infer iore ai 6 mesi; se ne raccomanda la somministrazione solo dopo aver co nsultato il medico tra i 6 mesi e i 2 anni di eta'.

**INTERAZIONI**

Nessuna nota.

**EFFETTI INDESIDERATI**

L'uso dei prodotti per applicazione topica, specie se prolungato, puo' dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. In tal caso interromper e il trattamento ed istituire una terapia idonea. Raramente un elevato assorbimento della benzocaina puo' provocare gravi reazioni (incremen to della metaemoglobina, con comparsa di cianosi), in particolare nei bambini e negli anziani, che richiedono un tempestivo intervento osped aliero. Segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il siste ma nazionale di segnalazione all'indirizzo.

**GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO**

Non sono note controindicazioni all'uso in caso di gravidanza o allatt amento. Si consiglia comunque di consultare il proprio medico prima di assumere il farmaco durante la gravidanza e l'allattamento.